


- Tipologias Vegetacionais e Uso da Terra**
- Floresta Ombrófila Densa Montana (primária)
  - Floresta Ombrófila Densa Montana (primária degradada)
  - Vegetação secundária de Floresta Ombrófila Densa Montana (capoeirao)
  - Vegetação secundária de Floresta Ombrófila Densa Montana (capoeirinha e capoeira)
  - Floresta Ombrófila Densa Submontana (primária)
  - Floresta Ombrófila Densa Submontana (primária degradada)
  - Vegetação secundária de Floresta Ombrófila Densa Submontana (capoeirao)
  - Vegetação secundária de Floresta Ombrófila Densa Submontana (capoeirinha e capoeira)
  - Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (primária)
  - Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (primária degradada)
  - Vegetação secundária de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (capoeirao)
  - Vegetação secundária de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (capoeirinha e capoeira)
  - Refúgio montano
  - Formação pioneira com influência marinha (praias)
  - Formação pioneira com influência marinha (costão rochoso)
  - Campo antrópico
  - solo exposto
  - Área urbana
  - Aglomerado de casas
  - Corpo d'água



PROJETO: **Plano de Manejo Parque Estadual de Ilhabela**

TÍTULO: **VEGETAÇÃO E USO DA TERRA**

Projeção: UTM Zona 23  
 Datum: SIRGAS2000  
 Escala Numérica: **1:50.000**

Base cartográfica: ortofotos coloridas, em escala 1:35.000, PPM/SMA, 2000/2001. Folhas topográficas do IBGE, escala 1:50.000, vetorizadas pelo PPM/SMA. Imagem SPOT sediada pela Fundação Florestal. Levantamento de dados: Casa da Floresta - Tatiana Pavão e Lídia Bertolo, modificado pela FF. Organização: Fabiano do Nascimento Pupim e Rafael Moraes Monteiro

