
ANEXO 10

Espécies de Aves Registradas no PEC

Espécies de aves com ocorrência constatada no Parque Estadual da Cantareira, por fisionomias vegetais e status de conservação, Legenda – END: espécie endêmica ao bioma Mata Atlântica; EXO: espécie exótica introduzida (alóctone); Fonte de Informação: P (dados primários, trabalhos de campo); S (dados secundários, bibliografia); Fisionomias Vegetais: AB = açudes e brejos; CA = campos naturais; FM = Floresta Ombrófila Densa Montana; PG= áreas antropizadas tais como jardins, pomares, gramados e capoeiras ralas; R = margens de riachos; T = taquarais. FM inclui diferentes estágios de sucessão, clareiras e bordas; *Status*: SP = espécies ameaçadas no Estado de São Paulo (Governo do Estado de São Paulo – Secretaria do Meio Ambiente, 1998); BR = espécies nacionalmente ameaçadas (IBAMA, 2003); UICN = espécies globalmente ameaçadas (UICN, 2007); Criticamente em perigo (CR); Em perigo (EN); Vulnerável (VU).

Táxons	Nome popular		Fonte de Informação	Fisionomias vegetais	Status		
					SP	BR	UICN
Tinamiformes							
Tinamidae							
<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	END	P	FM	VU		
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-guaçu		P	FM			
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã		P	FM			
Galliformes							
Cracidae							
<i>Penelope obscura</i> (Temminck, 1815)	jacuguaçu		P	FM			
Odontophoridae							
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru-capueira	END	P	FM			
Podicipediformes							
Podicipedidae							
<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador		P	AB			
Ciconiiformes							
Ardeidae							
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho		P	AB			
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande		P	AB			
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira		P	PG			
Threskiornithidae							
<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	coró-coró		P	AB			
Cathartiformes							
Cathartidae							
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha		P	FM PG			
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-preto		P	FM PG			
Falconiformes							
Accipitridae							
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza		P	FM			
<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	gavião-caracoleiro		S	FM	VU		
<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha		S	FM			
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi		P	FM			
<i>Accipiter striatus</i> (Vieillot, 1808)	gavião-miúdo		S	FM PG			

Táxons	Nome popular		Fonte de Informação	Fisionomias vegetais	Status		
					SP	BR	UICN
<i>Leucopternis lacernulatus</i> (Temminck, 1827)	gavião-pombo-pequeno	END	P	FM	CR	VU	VU
<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	gavião-caboclo		S	CA PG			
<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	gavião-asa-de-telha		S	CA PG	EN		
<i>Pernohierax leucorrhous</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	gavião-de-sobre-branco		P	FM			
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó		P	FM PG			
<i>Buteo brachyurus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-cauda-curta		P	FM PG			
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pegamacaco		P	FM	VU		
Falconidae							
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará		P	PG			
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro		P	PG			
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé		P	FM			
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio		P	FM			
<i>Falco femoralis</i> (Temminck, 1822)	falcão-de-coleira		P	PG			
Gruiformes							
Rallidae							
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-dobrejo	END	P	AB FM PG			
Charadriiformes							
Charadriidae							
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		P	PG			
Columbiformes							
Columbidae							
<i>Claravis godefrida</i> (Temminck, 1811)	pararu-espelho	END	S	FM T	CR	CR	CR
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pomba-asa-branca		P	PG			
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa		P	FM			
<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855)	juriti-pupu		P	FM			
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	juriti-gemeadeira		P	FM			
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	juriti-piranga		P	FM			
Psittaciformes							
Psittacidae							
<i>Aratinga auricapillus</i> (Kuhl, 1820)	jandaia-de-testa-vermelha		S	FM			
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	tiriba-de-testa-vermelha		P	FM			
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim-de-asa-azul		P	FM PG			
<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	END	P	FM PG			
<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	END	P	FM	VU		
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde		P	FM			
<i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820)	papagaio-do-peito-roxo	END	S	FM	CR	VU	VU
Cuculiformes							
Cuculidae							
<i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	papa-lagarta-americano		S	FM			
<i>Coccyzus euleri</i> (Cabanis, 1873)	papa-lagarta-de-euler		S	FM	EN		
<i>Coccyzus melacoryphus</i> (Vieillot, 1817)	papa-lagarta-		S	FM			

Táxons	Nome popular		Fonte de Informação	Fisionomias vegetais	Status		
					SP	BR	UICN
	acanelado						
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato		P	FM			
<i>Crotophaga ani</i> (Linnaeus, 1758)	anu-preto		S	PG			
Strigiformes							
Strigidae							
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-de-orelha		S	FM PG			
<i>Pulsatrix koenigswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni, 1901)	coruja-de-garganta-branca	END	S	FM			
<i>Strix hylophila</i> (Temminck, 1825)	coruja-listrada	END	S	FM			
<i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849)	coruja-de-bigodes		S	FM			
<i>Rhinoptynx clamator</i> (Vieillot, 1808)	coruja-orelhuda		S	FM PG			
Caprimulgiformes							
Caprimulgidae							
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju		P	FM			
<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	curiango-tesoura		P	PG			
<i>Macropsalis forcipata</i> (Nitzsch, 1840)	curiango-tesourão	END	S	FM			
Apodiformes							
Apodidae							
<i>Chaetura meridionalis</i> (Hellmayr, 1907)	taperá-do-temporal		P	FM PG			
Trochilidae							
<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839)	rabo-branco-acanelado		S	FM PG			
<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	END	P	FM PG			
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-cinza	END	P	FM			
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto		P	FM			
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	esmeralda-de-bico-vermelho		P	PG			
<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	END	P	FM PG			
<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	END	P	FM PG			
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca		P	FM			
<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul		P	FM PG			
<i>Clytolaema rubricauda</i> (Boddaert, 1783)	beija-flor-rubi	END	P	FM			
Trogoniformes							
Trogonidae							
<i>Trogon surrucura</i> (Vieillot, 1817)	surucua-variado	END	P	FM			
Coraciiformes							
Alcedinidae							
<i>Ceryle torquatus</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		P	AB R			
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde		P	AB R			
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno		S	AB R			

Táxons	Nome popular		Fonte de Informação	Fisionomias vegetais	Status		
					SP	BR	UICN
Galbuliformes							
Bucconidae							
<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	barbudo-rajado		P	FM			
Piciformes							
Ramphastidae							
<i>Ramphastos vitellinus</i> (Lichtenstein, 1823)	tucano-de-bico-preto		P	FM			
<i>Ramphastos dicolorus</i> (Linnaeus, 1766)	tucano-de-bico-verde	END	P	FM			
<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	saripoca-de-bico-riscado	END	S	FM			
<i>Pteroglossus bailloni</i> (Vieillot, 1819)	araçari-banana	END	P	FM			
Picidae							
<i>Picumnus cirratus</i> (Temminck, 1825)	pica-pau-anão-barrado		S	FM			
<i>Picumnus temminckii</i> (Lafresnaye, 1845)	picapau-anão-de-coleira	END	P	FM			
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	picapau-branco		P	PG			
<i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818)	benedito	END	P	FM			
<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	picapau-manchado		P	FM			
<i>Picus aurulentus</i> (Temminck, 1821)	picapau-verde-dourado	END	P	FM			
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	picapau-carijó		P	FM PG			
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	picapau-do-campo		P	PG			
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	picapau-velho		P	FM			
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	picapau-de-banda-branca		P	FM			
<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818)	picapau-rei	END	P	FM			
Passeriformes							
Thamnophilidae							
<i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)	chocão-carijó	END	P	FM			
<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão		P	FM T			
<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	borralhara-assobiadora	END	P	FM T			
<i>Thamnophilus caerulescens</i> (Vieillot, 1816)	choca-da-mata		P	FM			
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> (Vieillot, 1816)	choca-boné-ruivo		P	CA PG			
<i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823)	choquinha-de-peito-pintado	END	S	FM			
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa		P	FM			
<i>Myrmotherula gularis</i> (Spix, 1825)	choquinha-estrelada	END	P	FM			
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-ruiva		P	FM			
<i>Drymophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	dituí	END	P	FM T			
<i>Drymophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906)	trovoada-ocre	END	P	FM T			
<i>Drymophila malura</i> (Temminck, 1825)	trovoada-carijó	END	S	FM T			
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	olho-de-fogo-do-sul	END	P	FM			
<i>Myrmeciza squamosa</i> (Pelzeln, 1868)	formigueiro-da-grota	END	P	FM			
Conopophagidae							
<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente-		P	FM			

Táxons	Nome popular		Fonte de Informação	Fisionomias vegetais	Status		
					SP	BR	UICN
	marrom						
Grallariidae							
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu-malhado		P	FM			
<i>Hylopezus nattereri</i> (Pinto, 1937)	torom-malhado	END	S	FM			
Rhinocryptidae							
<i>Scytalopus speluncae</i> (Ménétrières, 1835)	macuquinho-serrano	END	P	FM T			
<i>Eleoscytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)	macuquinho-perereca	END	S	FM T			
Formicariidae							
<i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823)	tovaca-campinha		P	FM			
<i>Chamaeza meruloides</i> (Vigors, 1825)	tovaca-cantador	END	P	FM			
Scleruridae							
<i>Sclerurus scansor</i> (Menetries, 1835)	vira-folha-vermelho		P	FM			
Dendrocolaptidae							
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde		P	FM			
<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	cochi-de-garganta-branca		P	FM			
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> (Spix, 1825)	arapaçu-de-bico-preto		P	FM			
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	END	P	FM			
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis & Heine, 1859)	arapaçu-escamoso-do-sul	END	P	FM			
Furnariidae							
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		P	PG			
<i>Synallaxis cinerascens</i> (Temminck, 1823)	pi-puí		S	FM			
<i>Synallaxis ruficapilla</i> (Vieillot, 1819)	pichororé	END	P	FM			
<i>Synallaxis spixi</i> (Sclater, 1856)	joão-tenenem		P	FM PG			
<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	joão-pálido	END	P	FM			
<i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)	joão-botina	END	P	AB FM R T			
<i>Anabacerthia amaurotis</i> (Temminck, 1823)	limpa-folha-miúdo	END	P	FM			
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	limpa-folha-quiete		P	FM T			
<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroado	END	P	FM			
<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-canela		P	FM			
<i>Anabazenops fuscus</i> (Vieillot, 1816)	limpa-folha-de-coleira	END	P	FM T			
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco		P	FM			
<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-de-riacho		P	FM R			
<i>Heliobletus contaminatus</i> (Berlepsch, 1885)	trepadorzinho	END	P	FM			
<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	bico-virado-miúdo		P	FM			
<i>Xenops rutilans</i> (Temminck, 1821)	bico-virado-carijó		P	FM			
Tyrannidae							
<i>Mionectes rufiventris</i> (Cabanis, 1846)	abre-asa-de-cabeça-cinza	END	P	FM			

Táxons	Nome popular		Fonte de Informação	Fisionomias vegetais	Status		
					SP	BR	UICN
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> (Tschudi, 1846)	abre-asa-cabeçudo		P	FM			
<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822)	maria-de-olho-falso	END	P	FM T			
<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	maria-tiririzinha	END	P	FM			
<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	maria-verdinha	END	S	FM			
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó		P	FM T			
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	ferreirinho-teque-teque	END	P	FM			
<i>Phyllomyias burmeisteri</i> (Cabanis & Heine, 1859)	poaieiro-do-sul		S	FM			
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	poaieiro-triste		P	FM PG			
<i>Phyllomyias griseicapilla</i> (Sclater, 1862)	poaieiro-serrano	END	P	FM			
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	maria-é-dia		P	PG			
<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque		P	FM PG			
<i>Elaenia obscura</i> (D'orbigny & Lafresnaye, 1837)	guaracava-de-óculos		S	PG			
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha		P	FM PG			
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho-do-leste		S	PG			
<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	borboletinha		P	FM			
<i>Phylloscartes eximius</i> (Temminck, 1822)	barbudinho-do-sul	END	P	FM	CR		
<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	maria-cigarra	END	P	FM			
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		P	FM			
<i>Platyrinchus mystaceus</i> (Vieillot, 1818)	patinho-de-garganta-branca		P	FM			
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	felipe-de-peito-riscado		P	PG			
<i>Myiobius atricaudus</i> (Lawrence, 1863)	assanhadinho-de-cauda-preta		S	FM			
<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro		P	PG			
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado		P	FM			
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu-quieto		S	FM			
<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	piui-cinza		S	FM			
<i>Knipolegus cyanostris</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-pequena		S	FM			
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno		S	AB PG			
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	maria-viuvinha		S	FM			
<i>Legatus leucophaius</i> (Vieillot, 1818)	bentevi-pirata		P	FM			
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevi-de-coroa-vermelha		P	FM PG			
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-verdadeiro		P	FM PG			
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		P	FM			
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei		P	FM			
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	bentevi-peitica		P	FM			
<i>Tyrannus melancholicus</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-tropical		P	FM PG			
<i>Myiarchus swainsoni</i> (Cabanis & Heine, 1859)	maria-irré		P	FM			
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira		S	PG			
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	tinguaçu-de-	END	P	FM			

Táxons	Nome popular		Fonte de Informação	Fisionomias vegetais	Status			
					SP	BR	UICN	
		cabeça-cinza						
Cotingidae								
<i>Phibalura flavirostris</i> (Vieillot, 1816)	tesourinha-da-mata	END	S	FM PG	EN			
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	END	P	FM	VU		VU	
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó		P	FM	EN			
Pipridae								
<i>Neopelma chrysolophum</i> (Pinto, 1944)	fruchu-serrano	END	S	FM				
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira-branca		S	FM				
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará-dançarino	END	P	FM				
Tityridae								
<i>Oxyruncus cristatus</i> (Swainson, 1821)	bico-agudo		P	FM				
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim-verde	END	P	FM				
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	araponguinha-de-rabo-preto		P	FM				
<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)	caneleiro-castanho		P	FM				
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto		P	FM				
<i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-bordado		S	FM				
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-crista		P	FM				
Vireonidae								
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari		P	FM				
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara-oliva		P	FM				
<i>Hylophilus poicilotis</i> (Temminck, 1822)	vite-vite-coroado	END	P	FM				
Corvidae								
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818)	gralha-azul	END	S	FM				
Hirundinidae								
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-azul-e-branca		P	PG				
Troglodytidae								
<i>Troglodytes musculus</i> (Naumann, 1823)	corruíra-de-casa		P	PG				
Turdidae								
<i>Catharus fuscescens</i> (Stephens, 1817)	sabiá-norte-americano		S	FM				
<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-una		P	FM				
<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	sabiá-ferreiro		P	FM				
<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira		P	FM PG				
<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-de-cabeça-cinza		P	PG				
<i>Turdus amaurochalinus</i> (Cabanis, 1850)	sabiá-poca		P	FM PG				
<i>Turdus albicollis</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-coleira		P	FM				
Coerebidae								
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica		P	FM PG				
Thraupidae								
<i>Orchesticus abeillei</i> (Lesson, 1839)	tié-castanho	END	P	FM				
<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817)	tié-veludo		S	CA PG				
<i>Orthogonys chloricterus</i> (Vieillot, 1819)	catirumbava	END	P	FM				
<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tié-de-topete		P	FM				
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tié-da-mata		P	FM				

Táxons	Nome popular		Fonte de Informação	Fisionomias vegetais	Status		
					SP	BR	UICN
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	gurundi	END	P	FM			
<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaço-cinza		P	FM PG			
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva		P	FM			
<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-de-sete-cores	END	P	FM			
<i>Tangara cyanoventris</i> (Vieillot, 1819)	saíra-douradinha	END	S	FM			
<i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819)	saíra-da-serra	END	P	FM			
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-cabocla		P	PG			
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha		P	FM			
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul		P	FM			
<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	END	P	FM			
<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho		P	FM			
Emberizidae							
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico-verdadeiro		P	PG			
<i>Haplospiza unicolor</i> (Cabanis, 1851)	catatau	END	P	FM			
<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	tibirro-do-campo		S	PG			
<i>Emberizoides ypiranganus</i> (Ihering & Ihering, 1907)	tibirro-do-brejo		S	CA	EN		
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		P	PG			
<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pichochó	END	P	FM T	CR	VU	VU
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinha		S	PG			
<i>Arremon semitorquatus</i> (Swainson, 1838)	tico-tico-de-coleira-falha	END	S	FM			
Cardinalidae							
<i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)	bico-de-pimenta	END	P	FM			
<i>Saltator similis</i> (D'orbigny & Lafresnaye, 1837)	trinca-ferro-de-asa-verde		P	FM			
Parulidae							
<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita-do-sul		P	FM			
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra-do-sul		P	AB PG			
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula-coroado		P	FM			
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador		P	FM			
Icteridae							
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	japiim-guaxe		P	FM PG			
<i>Cacicus chrysopterus</i> (Vigors, 1825)	japiim-soldado		P	FM			
Fringillidae							
<i>Carduelis magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo-de-cabeça-preta		S	PG			
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim		P	FM PG			
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro		P	FM			
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	END	P	FM			
<i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822)	gaturamo-bandeira		S	FM			
Estrildidae							
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	bico-de-lacre	EXO	P	PG			
Passeridae							
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal domest	EXO	S	PG			