

ANEXO 9 - Espécies de Mamíferos registrados na Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade”, dispostas em ordem taxonômica seguindo a classificação encontrada em EMMONS (1989), com nome popular, tipo de registro, localização e tipo de ambiente.

Tipos de registro: 1 – capturas, 2 – observação direta diurna, 3 – observação direta noturna, 4 – rastros, 5 – entrevista, 6 – carcaça.

Localização: th = número do talhão.

Tipos de Ambiente: A – Eucalipto novo (menos de 10 anos)/ capoeira/ pasto, B – Eucalipto entre 10 e 40 anos/ Pinus, C – Eucalipto antigo (mais de 40 anos)/vegetação nativa, D – Paisagem antrópica (UNESP, Tiro de Guerra), E – Vegetação aquática.

Obs.: (A) Espécie levantada por Kátia Cury Roselli

(B) Seguindo a Classificação adotada por WILSON & REEDER (1993)

(C) Espécie levantada por Marcos Vinícios Vieira e sua equipe.

ORDEM/ FAMÍLIA/ ESPÉCIE	NOME POPULAR	TIPO DE REGISTRO	LOCALIZAÇÃO	TIPO DE AMBIENTE
ORDEM MARSUPIALIA				
Família Didelphidae				
<i>Didelphis marsupialis</i>	Gambá-de-orelha-preta, Raposinha	1	th 45	C
<i>Didelphis albiventris</i>	Gambá-de-orelha-branca, Raposinha	6 / 1	th 54, 45, 40, 92, UNESP	A / B / C / D
<i>Lutreolina crassicaudata</i> ^(A)	Cuica-d'água	1	Mata ciliar do Ribeirão Claro	
Família Marmosidae				
<i>Gracilinanus microtarsus</i>	Catita	1	th 45	C
ORDEM XENARTHRA				
Família Dasypodidae				
<i>Dasypus</i> sp	Tatu-galinha, Tatu-mulita	4	th 116, 108, 91i, 3, 8A, 50, 28, 4A, 14, UNESP	

<i>Euphractus sexcinctus</i>	Tatu-peludo	5		
ORDEM CARNIVORA				
Família Procyonidae				
<i>Procyon cancrivorus</i>	Mão-pelada	4	th 90	B
<i>Nasua nasua</i>	Coati	2	th 56, 91i	B / C
Família Mustelidae				
<i>Galictis cuja</i>	Furão	2	th 112, 116	A / C
<i>Eira barbara</i>	Iara	2	th 111, 11	A / C
Família Felidae				
<i>Herpailurus yagouaroundi</i> ^(B)	Gato-mourisco	5	th 116, UNESP	C / D
<i>Leopardus sp</i> ^(B)	Gato-do-mato	4	Cana-de-açucar, th 119, 120, 21	C / D
ORDEM ARTIODACTYLA				
Família Cervidae				
<i>Mazama gouazoubira</i>	Veado-catingueiro, Veado- virá	4 / 2	Cana-de-açucar, th 54, 3, 116, 118, 109, 21, 120, 121B	A / B / C
ORDEM RODENTIA				
Família Cricetidae				
<i>Nectomys squamipes</i> ^(C)	Rato-d'água	1	ilha	C
Família Muridae				
<i>Oligoryzomys sp</i>	Rato-do-mato	1	th 40, 45, 5	A / B / C
Família Erithizontidae				
<i>Coendou sp</i>	Ouriço	5	Genética	C

Família Hydrochaeridae <i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	Capivara	5	Açude (lago)	E
Família Agoutidae <i>Agouti paca</i>	Paca	5	Açude (lago)	E
Família Capromyidae <i>Myocastor coypus</i>	Ratão-do-banhado	2	Açude (lago)	E
Família Caviidae <i>Cavia aperea</i>	Preá	2	Ponte da Estação de captação de água do DAAE, th 58.	C
ORDEM LAGOMORPHA				
Família Leporidae <i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Tapiti, Lebre	3	Cana-de-açucar, th 41, 55A	A / B / C

FONTE: CHAGAS, F., *Inventário dos mamíferos não-voadores do Horto Florestal “Navarro de Andrade”, Rio Claro – SP*, monografia para obtenção do título de bacharel em Ciências Biológicas, Depto. De Ecologia, Instituto de Biociências, UNESP, Rio Claro – SP, 1997.