

# **ANEXO 5**

## **Aves**



**Tabela 1** – Lista total de espécies de aves com ocorrência constatada no Parque Estadual Carlos Botelho e na Estação Ecológica de Xitué (\*), por fisionomias vegetais e *status* de conservação.

Táxons	Nome Popular		Fonte de Informação	Fisionomias Vegetais	Status		
					SP	BR	UICN
Tinamiformes							
Tinamidae							
<b><i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)*</b>	macuco	END	P	FM FS	VU		
<b><i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)*</b>	inhambu-guaçu		P	FM FS			
<i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied, 1820)	zabelê	END	P	FS	CR	VU	
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã		S	FM FS			
Anseriformes							
Anatidae							
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí		S	AB			
Galliformes							
Cracidae							
<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguaçu		P	FM FS			
<b><i>Aburria jacutinga</i> (Spix, 1825)*</b>	jacutinga	END	P	FM FS	CR	EN	EN
Odontophoridae							
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru-capueira	END	P	FM FS			
Podicipediformes							
Podicipedidae							
<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	mergulhão-pompom		S	AB			
Ciconiiformes							
Ardeidae							
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira		P	PG			
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho		S	AB			
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande		P	AB			
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira		P	PG			
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garcinha-branca		S	AB			
Threskiornithidae							
<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca-comum		P	PG			

Táxons	Nome Popular		Fonte de Informação	Fisionomias Vegetais	Status		
Cathartiformes							
Cathartidae							
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha		P	FM FS PG			
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-preto		P	FM FS PG			
Falconiformes							
Accipitridae							
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza			FM FS			
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura		S	FM FS			
<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha		S	FM FS			
<i>Accipiter superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	gavião-miudinho		S	FM FS			
<i>Accipiter striatus</i> Vieillot, 1808	gavião-miúdo		S	FM FS			
<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817)	gavião-bombacha		S	FM FS			
<i>Leucopternis lacernulatus</i> (Temminck, 1827)	gavião-pombo-pequeno	END	S	FM FS	CR	VU	VU
<b><i>Leucopternis polionotus</i> (Kaup, 1847)*</b>	gavião-pombo-grande	END	P	FM FS	VU		
<i>Pernohierax leucorrhous</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	gavião-de-sobre-branco		S	FM FS			
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó		P	FM FS PG			
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta		P	FM FS			
<i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-pato		S	FM FS	EN		
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)*	gavião-pega-macaco		P	FM FS	VU		
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	gavião-de-penacho		S	FM FS	CR		
Falconidae							
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará		P	PG			
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro		P	PG			
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã		P	FM FS			
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé		P	FM FS			
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio		P	FM FS			
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri		S	PG			
Gruiformes							
Rallidae							
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-brejo	END	P	AB FM FS			
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda		S	AB			

<b>Táxons</b>	<b>Nome Popular</b>		<b>Fonte de Informação</b>	<b>Fisionomias Vegetais</b>	<b>Status</b>		
<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó		S	AB			
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-preta		S	AB			
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	galinha-d' água		S	AB			
Cariamidae							
<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	seriema		P	PG			
Charadriiformes							
Jacanidae							
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã		S	AB			
Charadriidae							
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero		P	PG			
Columbiformes							
Columbidae							
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa		P	PG			
<b><i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)*</b>	pomba-asa-branca		P	PG			
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega		P	FS			
<b><i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818) *</b>	pomba-amargosa		P	FM FS			
<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	avoante		S	PG			
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu		S	FM FS			
<b><i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard &amp; Bernard, 1792)*</b>	juriti-gemeadeira		P	FM FS			
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	juriti-piranga		P	FM FS			
Psittaciformes							
Psittacidae							
<b><i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)*</b>	tiriba-de-testa-vermelha		P	FM FS			
<b><i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)*</b>	tuim-de-asa-azul		P	PG FM FS			
<b><i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)*</b>	periquito-rico	END	P	PG FM FS			
<b><i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)*</b>	cuiú-cuiú	END	P	FM FS	VU		
<b><i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)*</b>	maitaca-verde		P	FM FS			
<b><i>Triclaria malachitacea</i> (Spix, 1824)*</b>	sabiaca	END	P	FM FS	CR		
Cuculiformes							
Cuculidae							
<i>Coccyzus euleri</i> (Cabanis, 1873)	papa-lagarta-de-euler		S	FS	EN		

Táxons	Nome Popular		Fonte de Informação	Fisionomias Vegetais	Status		
<b><i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)*</b>	alma-de-gato		P	FM FS			
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto		P	PG			
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco		P	PG			
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci-do-campo		S	PG			
Strigiformes							
Tytonidae							
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	suindara		P	PG			
Strigidae							
<i>Megascops atricapilla</i> (Temminck, 1822)	corujinha-sapo	END	S	FM FS			
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-de-orelha		S	PG FM FS			
<i>Pulsatrix koenigswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni, 1901)	coruja-de-garganta-branca	END	P	FM FS			
<i>Strix hylophila</i> Temminck, 1825	coruja-listrada	END	P	FM FS			
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	caburé-ferrugem		S	FS			
<i>Glaucidium minutissimum</i> (Wied, 1830)	caburé-miudinho	END	P	FM FS			
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira		S	PG			
Caprimulgiformes							
Nyctibiidae							
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	urutau-comum		P	FM FS			
Caprimulgidae							
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju		P	FM FS			
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	curiango-comum		P	PG			
<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	curiango-tesoura		P	PG			
<i>Macropsalis forcipata</i> (Nitzsch, 1840)	curiango-tesourão	END	S	FM			
Apodiformes							
Apodidae							
<i>Cypseloides fumigatus</i> (Streubel, 1848)	taperuçu-preto		S	FM FS			
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca		P	FM FS			
<b><i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862*</b>	taperá-de-barriga-cinza		P	FM FS			
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	taperá-do-temporal		P	FM FS			
<i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	taperá-tesoura		P	FS			
Trochilidae							

Táxons	Nome Popular		Fonte de Informação	Fisionomias Vegetais	Status
<i>Ramphodon naevius</i> (Dumont, 1818)	beija-flor-rajado	END	P	FS	
<i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-besourão		S	FS	
<i>Phaethornis squalidus</i> (Temminck, 1822)	rabo-branco-pequeno	END	P	FM FS	
<b><i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)*</b>	rabo-branco-de-garganta-rajada	END	P	FM FS	
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura		P	PG	
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-cinza	END	P	FM FS	
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto		P	FM FS	
<i>Anthracothonax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta		S	FM FS	
<i>Lophornis chalybeus</i> (Vieillot, 1823)	topetinho-verde		P	FM FS	
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	esmeralda-de-bico-vermelho		S	PG	
<b><i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)*</b>	beija-flor-de-fronte-violeta	END	P	FM FS	
<i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-roxo		S	FS	
<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	END	P	FM FS	
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca		P	FM FS	
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde		S	FS	
<i>Clytolaema rubricauda</i> (Boddaert, 1783)	beija-flor-rubi	END	P	FM	
<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	estrelinha-ametista		S	FM FS	
Trogoniformes					
Trogonidae					
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	surucuá-de-barriga-dourada		P	FM FS	
<b><i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817*</b>	surucuá-variado	END	P	FM FS	
<b><i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788*</b>	surucuá-de-barriga-amarela		P	FM FS	
Coraciiformes					
Alcedinidae					
<i>Ceryle torquatus</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande		P	AB R	
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde		P	AB R	
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno		P	AB R	
<i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-da-mata		P	FS (R)	
Momotidae					
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	juruva-verde		P	FM FS	
Galbuliformes					

Táxons	Nome Popular		Fonte de Informação	Fisionomias Vegetais	Status		
Bucconidae							
<i>Notharchus swainsoni</i> (Gray, 1846)	macuru-de-barriga-ruiva	END	S	FM FS			
<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)	fevereiro		S	PG			
<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	barbudo-rajado		S	FM FS			
Piciformes							
Ramphastidae							
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto		P	FS			
<b><i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766*</b>	tucano-de-bico-verde	END	P	FM FS			
<b><i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)*</b>	saripoca-de-bico-riscado	END	S	FM FS			
<i>Pteroglossus bailloni</i> (Vieillot, 1819)	araçari-banana	END	S	FM FS			
Picidae							
<b><i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845*</b>	picapau-anão-de-coleira	END	P	FM FS			
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	picapau-branco		P	PG			
<i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818)	benedito	END	P	FM FS			
<b><i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)*</b>	picapau-manchado		P	FM FS			
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	picapau-bufador		P	FS			
<b><i>Piculus aurulentus</i> (Temminck, 1821)*</b>	picapau-verde-dourado	END	P	FM			
<b><i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)*</b>	picapau-carijó		P	FM FS			
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	picapau-do-campo		P	PG			
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	picapau-velho		P	FM FS			
<i>Dryocopus galeatus</i> (Temminck, 1822)	picapau-de-cara-canela	END	S	FM	CR	VU	VU
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	picapau-de-banda-branca		P	FM FS			
<b><i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818)*</b>	picapau-rei	END	P	FM FS			
Passeriformes							
Thamnophilidae							
<b><i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)*</b>	chocão-carijó	END	P	FM FS			
<b><i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)*</b>	matracão		P	FM FS			
<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	borralhara-assobiadora	END	P	FM			
<b><i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823)*</b>	borralhara-preta	END	P	FM FS			
<i>Biatas nigropectus</i> (Lafresnaye, 1850)	choca-da-taquara	END	S	FM (T)	CR	VU	VU
<i>Thamnophilus caeruleus</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata		P	FM			



Táxons	Nome Popular		Fonte de Informação	Fisionomias Vegetais	Status		
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816	choca-boné-ruivo		S	PG			
<i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823)	choquinha-de-peito-pintado	END	P	FM FS			
<b><i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)*</b>	choquinha-lisa		P	FM FS			
<i>Dysithamnus xanthopterus</i> Burmeister, 1856	choquinha-de-asa-ferrugem	END	S	FM			
<b><i>Myrmotherula gularis</i> (Spix, 1825)*</b>	choquinha-estrelada	END	P	FM FS			
<i>Myrmotherula minor</i> Salvadori, 1864	choquinha-pequena	END	P	FS	EN	VU	VU
<i>Myrmotherula unicolor</i> (Menetries, 1835)	choquinha-cinzenta	END	P	FS	VU		
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-ruiva		P	FM FS			
<b><i>Drymophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)*</b>	dituí	END	P	FM FS			
<i>Drymophila rubricollis</i> (Bertoni, 1901)	trovoada-de-bertoni	END	P	FM (T)			
<b><i>Drymophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906)*</b>	trovoada-ocre	END	P	FM (T)			
<b><i>Drymophila malura</i> (Temminck, 1825)*</b>	trovoada-carijó	END	P	FM			
<i>Drymophila squamata</i> (Lichtenstein, 1823)	pintadinho	END	S	FS			
<b><i>Terenura maculata</i> (Wied, 1831)*</b>	zidedê-do-sul	END	P	FM FS			
<b><i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)*</b>	olho-de-fogo-do-sul	END	P	FM FS			
<b><i>Myrmeciza squamosa</i> Pelzeln, 1868*</b>	formigueiro-da-grota	END	P	FM FS			
Conopophagidae							
<b><i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)*</b>	chupa-dente-marrom		P	FM FS			
<i>Conopophaga melanops</i> (Vieillot, 1818)	chupa-dente-de-máscara	END	P	FM FS			
Grallariidae							
<b><i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)*</b>	tovacuçu-malhado		P	FM FS			
<i>Hylopezus nattereri</i> Pinto, 1937	torom-malhado	END	S	FM			
Rhinocryptidae							
<i>Psilorhamphus guttatus</i> (Ménétrières, 1835)	macuquinho-pintado	END	P	FM FS			
<i>Merulaxis ater</i> Lesson, 1830	bigodudo-preto	END	P	FM FS			
<b><i>Scytalopus speluncae</i> (Ménétrières, 1835)*</b>	macuquinho-serrano	END	P	FM FS			
<b><i>Scytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)*</b>	macuquinho-perereca	END	P	FM FS			
Formicariidae							
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	pinto-da-mata-coroadado		P	FS			
<b><i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823)*</b>	tovaca-campainha		P	FM FS			
<b><i>Chamaeza meruloides</i> Vigors, 1825*</b>	tovaca-cantador	END	P	FM FS			

Táxons	Nome Popular		Fonte de Informação	Fisionomias Vegetais	Status
Scleruridae					
<b><i>Sclerurus scansor</i> (Menetries, 1835)*</b>	vira-folha-vermelho		P	FM FS	
Dendrocolaptidae					
<b><i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820)*</b>	arapaçu-liso	END	P	FM FS	
<b><i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)*</b>	arapaçu-verde		P	FM FS	
<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	cochi-de-garganta-branca		P	FM FS	
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	arapaçu-de-bico-preto		P	FM FS	
<b><i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)*</b>	arapaçu-rajado	END	P	FM FS	
<b><i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis &amp; Heine, 1859)*</b>	arapaçu-escamoso-do-sul	END	P	FM FS	
<b><i>Campylorhamphus falcularius</i> (Vieillot, 1822)*</b>	arapaçu-alfange	END	P	FM FS	
Furnariidae					
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro		P	PG	
<i>Leptasthenura setaria</i> (Temminck, 1824)	grimpeiro	END	P	AR	
<i>Synallaxis cinerascens</i> Temminck, 1823	pi-puí		S	FM	
<b><i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819*</b>	pichororé	END	P	FM FS	
<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-tenenem		P	FM FS	
<i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831)	joão-pálido	END	P	FM FS	
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	joão-do-brejo		S	AB	
<b><i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pelzeln, 1858)*</b>	joão-botina	END	P	AB	
<i>Anabacerthia amaurotis</i> (Temminck, 1823)	limpa-folha-miúdo	END	P	FM	
<b><i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)*</b>	limpa-folha-quiete		P	FM	
<i>Philydor lichtensteini</i> Cabanis & Heine, 1859	limpa-folha-de-coroa-cinza	END	P	FM FS	
<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroado	END	P	FM FS	
<b><i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)*</b>	limpa-folha-de-testa-canela		P	FM FS	
<b><i>Anabazenops fuscus</i> (Vieillot, 1816)*</b>	limpa-folha-de-coleira	END	P	FM FS (T)	
<i>Cichlocolaptes leucophrus</i> (Jardine & Selby, 1830)	limpa-folha-gritador	END	S	FM FS	
<b><i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)*</b>	barranqueiro-de-olho-branco		P	FM FS	
<b><i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)*</b>	joão-de-riacho		P	FM FS (R)	
<b><i>Heliobletus contaminatus</i> Berlepsch, 1885*</b>	trepadorzinho	END	P	FM	
<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	bico-virado-miúdo		P	FM FS	
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó		P	FM FS	

Táxons	Nome Popular		Fonte de Informação	Fisionomias Vegetais	Status		
Tyrannidae							
<b>Mionectes rufiventris Cabanis, 1846*</b>	abre-asa-de-cabeça-cinza	END	P	FM FS			
<b>Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846*</b>	abre-asa-cabeçudo		P	FM FS			
<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822)	maria-de-olho-falso	END	S	FM (T)			
<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	maria-tiririzinha	END	P	FS			
<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	maria-verdinha	END	S	FM FS			
<b>Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846)*</b>	tororó		P	FM FS			
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	ferreirinho-teque-teque	END	P	FM FS			
<i>Phyllomyias burmeisteri</i> Cabanis & Heine, 1859	poaieiro-do-sul		S	FM FS			
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	poaieiro-triste		P	FM PG			
<i>Phyllomyias griseicapilla</i> Sclater, 1862	poaieiro-serrano	END	P	FM FS			
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	maria-da-copa		P	FS			
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	maria-é-dia		S	PG			
<i>Elaenia albiceps</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	guaracava-de-crista-branca		S	PG			
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-verde			FM PG			
<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	guaracava-de-óculos		S	PG			
<b>Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824)*</b>	risadinha		P	PG FM FS			
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho-do-leste		P	PG			
<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	borboletinha		P	FM			
<i>Phylloscartes paulista</i> Ihering & Ihering, 1907	não-pode-parar	END	P	FS	VU		
<b>Phylloscartes oustaleti (Sclater, 1887)*</b>	treme-rabo	END	P	FM FS			
<i>Phylloscartes sylviolus</i> (Cabanis & Heine, 1859)	maria-pequena	END	S	FM FS			
<b>Myiornis auricularis (Vieillot, 1818)*</b>	maria-cigarra	END	P	FM FS			
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta		P	FM FS			
<b>Platyrrinchus mystaceus Vieillot, 1818*</b>	patinho-de-garganta-branca		P	FM FS			
<i>Platyrrinchus leucoryphus</i> Wied, 1831	patinho-de-asa-castanha	END	S	FS	EN		VU
<i>Onychorhynchus swainsoni</i> (Pelzeln, 1858)	maria-lecre	END	P	FM FS	EN		VU
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	felipe-de-peito-riscado		S	PG			
<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	assanhadinho-de-peito-dourado		P	FS			
<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	gibão-de-couro		S	PG			
<b>Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868)*</b>	enferrujado		P	FM FS			

Táxons	Nome Popular		Fonte de Informação	Fisionomias Vegetais	Status		
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu-quieto		S	FS			
<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	piui-cinza		S	FM FS			
<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-pequena		S	FM FS			
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno		S	AB PG			
<i>Muscipipra vetula</i> (Lichtenstein, 1823)	tesourinha-cinza	END	P	FM FS			
<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	maria-velhinha		S	AB			
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	maria-viuvinha		P	FM FS			
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro		P	PG			
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bentevi-pirata		P	FM FS			
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevi-de-coroa-vermelha		P	PG FM FS			
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bentevi-verdadeiro		P	PG FM FS			
<i>Conopias trivirgatus</i> (Wied, 1831)	bentevi-de-três-riscas		P	FM FS			
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bentevi-rajado		S	FM FS			
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei		P	FM FS			
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	bentevi-peitica		S	FM FS			
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri-tropical		P	PG FM FS			
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha-do-campo		S	PG			
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	maria-assobiadeira		P	FM FS			
<b><i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis &amp; Heine, 1859*</b>	maria-irré		P	FM FS			
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira		S	FS			
<b><i>Ramphotrigon megacephalum</i> (Swainson, 1835)*</b>	maria-cabeçuda		P	FM FS			
<i>Attila phoenicurus</i> Pelzelin, 1868	tinguaçu-castanho		S	FM FS			
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	tinguaçu-de-cabeça-cinza	END	P	FM FS			
Oxyruncidae							
<b><i>Oxyruncus cristatus</i> Swainson, 1821*</b>	bico-agudo		P	FM FS			
Cotingidae							
<i>Phibalura flavirostris</i> Vieillot, 1816	tesourinha-da-mata	END	S	FM FS	EN		
<b><i>Carpornis cucullata</i> (Swainson, 1821)*</b>	corocochó	END	P	FM FS			
<i>Carpornis melanocephala</i> (Wied, 1820)	cochó	END	P	FS	CR	VU	VU
<b><i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)*</b>	araponga	END	P	FM FS	VU		VU
<b><i>Lipaugus lanioides</i> (Lesson, 1844)*</b>	cricrió-suisso	END	P	FM FS	VU		

Táxons	Nome Popular		Fonte de Informação	Fisionomias Vegetais	Status		
<b><i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)*</b>	pavó		P	FM FS	EN		
Pipridae							
<i>Neopelma chrysolophum</i> Pinto, 1944	fruchu-serrano	END	S	FM			
<b><i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)*</b>	caneleirinho-cantor		P	FM FS			
<i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809)	tangarazinho	END	P	FM FS			
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira-branca		P	FS			
<b><i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw &amp; Nodder, 1793)*</b>	tangará-dançarino	END	P	FM FS			
Tityridae							
<b><i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)*</b>	flautim-verde	END	P	FM FS			
<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	araponguinha-de-cara-preta		S	FM FS			
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	araponguinha-de-rabo-preto		S	FM FS			
<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde		P	FM FS			
<b><i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine &amp; Selby, 1827)*</b>	caneleiro-castanho		P	FM FS			
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto		P	FM FS			
<i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-bordado		P	FS			
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-crista		S	FM FS			
Vireonidae							
<b><i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)*</b>	pitiguari		P	FM FS			
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruvicara-oliva		P	FM FS			
<b><i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822*</b>	vite-vite-coroado	END	P	FM			
Corvidae							
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818)	gralha-azul	END	P	FS			
Hirundinidae							
<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-frente-branca		S	PG			
<i>Progne subis</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-azul		S	PG			
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-grande		P	PG			
<b><i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)*</b>	andorinha-azul-e-branca		P	PG			
<i>Neochelidon tibialis</i> (Cassin, 1853)	andorinha-de-coxa-branca		S	FM FS			
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora-do-sul		P	PG			
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-da-chaminé		S	AB			
Troglodytidae							

Táxons	Nome Popular		Fonte de Informação	Fisionomias Vegetais	Status
<i>Thryothorus longirostris</i> Vieillot, 1819	garrincha-açu		S	FS	
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra-de-casa		P	PG	
Poliopitidae					
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	balança-rabo-de-bico-longo		P	FM FS	
Turdidae					
<b><i>Platycichla flavipes</i> (Vieillot, 1818)*</b>	sabiá-una		P	FM FS	
<b><i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818*</b>	sabiá-laranjeira		P	PG FM FS	
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-de-cabeça-cinza		P	PG	
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca		P	PG FM FS	
<b><i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818*</b>	sabiá-coleira		P	FM FS	
Mimidae					
<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	tejo-do-campo		S	PG	
Motacillidae					
<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor		S	PG	
Coerebidae					
<b><i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)*</b>	cambacica		P	PG FM FS	
Thraupidae					
<i>Orchesticus abeillei</i> (Lesson, 1839)	tié-castanho	END	S	FM FS	
<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817)	tié-veludo		S	PG	
<b><i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)*</b>	tietinga		P	FM FS	
<b><i>Orthogonys chloricterus</i> (Vieillot, 1819)*</b>	catirumbava	END	P	FM FS	
<b><i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)*</b>	tié-de-topete		P	FM FS	
<b><i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)*</b>	tié-da-mata		P	FM FS	
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tié-galo		P	FS	
<b><i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)*</b>	gurundi	END	P	FM FS	
<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tié-sangue	END	P	FS	
<b><i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)*</b>	sanhaço-cinza		P	PG FM FS	
<b><i>Thraupis cyanoptera</i> (Vieillot, 1817)*</b>	sanhaço-da-serra	END	P	FM FS	
<b><i>Thraupis ornata</i> (Sparrman, 1789)*</b>	sanhaço-rei	END	P	FM FS	
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaço-do-coqueiro		P	PG FM FS	
<b><i>Stephanophorus diadematus</i> (Temminck, 1823)*</b>	sanhaço-frade	END	S	FM	

Táxons	Nome Popular		Fonte de Informação	Fisionomias Vegetais	Status		
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva		P	FM FS			
<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-de-sete-cores	END	P	FM FS			
<b><i>Tangara cyanocephala</i> (Statius Muller, 1776)*</b>	saíra-militar	END	P	FM FS			
<i>Tangara desmaresti</i> (Vieillot, 1819)	saíra-da-serra	END	P	FM			
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-cabocla		P	PG			
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha		P	FM FS			
<i>Dacnis nigripes</i> Pelzeln, 1856	saí-de-perna-preta	END	S	FM FS	EN		
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul		P	FM FS			
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde		P	FS			
<b><i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)*</b>	saíra-ferrugem	END	P	FM FS			
Emberizidae							
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico-verdadeiro		P	PG			
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo		P	PG			
<b><i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851*</b>	catatau	END	P	FM FS			
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra		P	PG			
<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	tibirro-do-campo		S	PG			
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu		P	PG			
<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pichochó	END	P	FM FS (T)	CR	VU	VU
<b><i>Sporophila falcirostris</i> (Temminck, 1820)*</b>	papa-capim-da-taquara	END	P	FM FS (T)	CR	VU	VU
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho		S	PG			
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinha		S	PG			
<i>Amaurospiza moesta</i> (Hartlaub, 1853)	cigarrinha-da-taquara	END	S	FM	VU		
<i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830)	cigarrinha-do-coqueiro		S	FM FS			
<i>Arremon semitorquatus</i> Swainson, 1838	tico-tico-de-coleira-falha	END	S	FM FS			
Cardinalidae							
<b><i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)*</b>	bico-de-pimenta	END	P	FM FS			
<b><i>Saltator similis</i> d'Orbigny &amp; Lafresnaye, 1837*</b>	trinca-ferro-de-asa-verde		P	FM FS			
<i>Cyanoloxia glaucoerulea</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	azulinho-do-sul		S	FM FS			
<i>Cyanocompsa brissonii</i> (Lichtenstein, 1823)	azulão-verdadeiro		S	AB FM	VU		
Parulidae							
<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita-do-sul		P	FM FS			

Táxons	Nome Popular		Fonte de Informação	Fisionomias Vegetais	Status
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra-do-sul		S	AB PG	
<b><i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)*</b>	pula-pula-coroado		P	FM FS	
<i>Basileuterus hypoleucus</i> Bonaparte, 1830	pula-pula-pichito		P	FM	
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador		P	FM	
<b><i>Phaeothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)*</b>	pula-pula-ribeirinho		P	FM FS (R)	
Icteridae					
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	japiim-guaxe		P	FM FS	
<b><i>Cacicus chrysopterus</i> (Vigors, 1825)*</b>	japiim-soldado		P	FM FS	
<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	encontro		P	FM	
<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	pássaro-preto		S	PG	
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim-gaudério		P	PG	
<i>Sturnella supercilialis</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul		S	AB	
Fringillidae					
<i>Carduelis magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo-de-cabeça-preta		S	PG	
<i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)	gaturamo-rei		S	FM	
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro		P	FM FS	
<i>Euphonia chalybea</i> (Mikan, 1825)	cais-cais	END	P	FM	EN
<b><i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)*</b>	ferro-velho	END	P	FM FS	
<i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822)	gaturamo-bandeira		S	FM FS	
Passeridae					
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal-doméstico	EXO	S	PG	

**Legenda** – END: espécie endêmica ao bioma Mata Atlântica; EXO: espécie exótica introduzida da Europa; **Fonte de Informação:** P (dados primários, trabalhos de campo); S (dados secundários, bibliografia); **Fisionomias Vegetais:** AB = açudes e brejos; FM = Floresta Ombrófila Densa Montana; FS = Floresta Ombrófila Densa Submontana e das Terras Baixas; PG= áreas antropizadas tais como jardins, pomares, gramados e capoeiras ralas; R = margens de riachos; T = taquarais. FM e FS incluem clareiras e bordas; **Status:** SP = espécies ameaçadas no Estado de São Paulo (Governo do Estado de São Paulo – Secretaria do Meio Ambiente, 1998 ); BR = espécies nacionalmente ameaçadas (IBAMA, 2003); UICN = espécies globalmente ameaçadas (UICN, 2006); Criticamente em perigo (CR); Em perigo (EN); Vulnerável (VU)